

ခြင်လောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေး ၁၀ ချက်

ဖုံး	ရေအိုး၊ ရေတွင်းများကို ဖုံးထားခြင်း။
သွန်	ရေအောင်းနိုင်သော ရေအိုးများ၊ ရေခွက်များကို သွန်ခြင်း။
လဲ	ဘုရားပန်းအိုးများ ရေပုံမှန်လဲပေးခြင်း။
စစ်	ပိုးလောက်လန်းများကို ရေစစ်ဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း။
လောင်း	ဘီရိုအောက်ခံရေခွက်များထဲသို့ ရေနံ့ဆီ စသည်တို့ဖြင့် လောင်းခြင်း။
မြှုပ်	ရေဝပ်နိုင်သော ရေအိုးကွဲ၊ တာယာတောင်းများ မြှုပ်ခြင်း။
ရှင်း	ခြုံများရှင်းခြင်း။
မှုတ်	ခြင်ဆေးမှုတ်ခြင်း။

မိုးရာသီက သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အဖြစ်များတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့် ကလေးတွေ ကိုယ်ပူလာရင် ဆေးရုံသွားပြဖို့လိုပါတယ်။

သမီးဖျားနေတာ ၃ ရက်ကျော်ပြီ။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ ဆေးရုံ လိုက်ပို့ပေးပါ ဗေဗေ...။



သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ။


(ဗြဲဗြဲစတုရန်း)

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင် လာတဲ့ အေးဒိစ်ခြင်ကျား အကိုက်ခံရရာက ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ အသက်ခြောက်လ မှ အသက် ၂၀ နှစ်အတွင်း ကလေး၊ လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတယ်။



ကလေးတွေမှာ ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာ အချိန်မီမကုသရင် သေဆုံးနိုင်တယ်။

ဒီလို နေရာတွေမှာ ရှိတယ်



၁၅၀၀/၃၄၃၂, တမ်ဘွန် မဟာချိုင်း၊ အမ်ဖို မူရန် စမ္မတ်စခွန်၊ ၇၄၀၀၀။


ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဆို အရေးကြီးလဲ

၂ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ အပြင်းဖျားခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အနီစက်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ ရှုတ်တရက် အဖျားကျခြင်း၊ ခြေဖျား လက်ဖျားများ အေးခြင်း။

MOSQUITO = Dengue
ခြင် = သွေးလွန်တုပ်ကွေး

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားပါက ဂရုစိုက်ပြီး အရည်များများ တိုက်ရမယ်။ ဓာတ်ဆားရည်၊ ဖျော်ရည်၊ နို့၊ ဟောလစ်၊ စွပ်ပြုတ်တို့ ကျွေးနိုင်ပြီး အဖျားကြီး လွန်းရင် ရေချိုးပေးနိုင်တယ်။ ရေဖတ် တိုက်နိုင်တယ်။

ပါရာစီတမောဆေးပြား၊ ဆေးရည် တိုက်ကျွေးနိုင် ပါတယ်။



ကလေးငယ်တွေ အပူကြီးပြီး မိုန်းလွန်းရင်၊ အစားအသောက်နဲ့ အရည်မဝင်ရင် ဆရာဝန် နဲ့ပြပါ။ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရည်လုံးဝ လက်မခံဘဲ ဆက်တိုက် အန်နေရင်၊ ကော်ဖီရောင် သို့မဟုတ် အမည်းရောင်တွေ ပါနေရင်၊ မိုန်းလွန်းရင် ဆေးရုံသွားပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။



ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ

ခြင်ကိုက် မခံရအောင် ကလေးတွေကို အဝတ်အစား လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်စေခြင်း။



ခြင်ထောင်၊ ခြင်ဆေးရည်စိမ် ခြင်ထောင်နဲ့ အိပ်စေခြင်း။

